

| Вещество | Другие названия | Фарм группа | Хим группа | Торч группа | Описание | Фарм действие | Эффекты | Побочки | ☆ | Дозы, мг | | Время действия, ч | | Зависи мость | Отбивка | Достать |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----|----------|-----|-------------------|----|--------------|---------------|-------------|
| Эфедрин | Бронхолитин | Стимулятор | Фенэтиламин | Торчевое | Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочек и вроде как тоже обладающий психоактивными свойствами. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт. | Релизер дофамина и норадреналина | Стимуляция, эйфория | Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция | 5 | 55 | 115 | 3 | 5 | Слабая | | Трудно |
| Псевдоэфедрин | Каффетин Колд | Стимулятор | Фенэтиламин | Торчевое | Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и значительно меньше эйфории. Покупается в виде таблеток с ДХМ (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола. | Релизер дофамина и норадреналина | Стимуляция, эйфория | Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция | 3 | 100 | 200 | 3 | 5 | Слабая | Холодная вода | Легко |
| Сибутрамин | Голдлайн | Стимулятор | | Утилитарное, торчевое | Средство для похудения, отбивает аппетит. Дает неприятную стимуляцию и эффекты похожие на СИОСЗ антидепрессанты. | ИОЗ серотонина и норадреналина | Стимуляция | Бессоница, тахикардия, высокое давление, головная боль, тошнота | 3 | 15 | 60 | 6 | 10 | Нет | | Трудно |
| Атомoksetин | Страттера, Когнитерра | Стимулятор | | Утилитарное, торчевое | Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. | ИОЗ норадреналина | Стимуляция | Тахикардия | 3 | | | | | Нет | | Средне |
| Йохимбин | | Стимулятор | | Утилитарное, торчевое | Средство для потенции, афродизик. Дает неприятную стимуляцию. | Антагонист альфа-2 адренорецепторов | Стимуляция | Бессоница, тахикардия, судороги | 2 | | | | | Нет | | Средне |
| Фенилпирacetам | Фенотропил, Нанотропил | Стимулятор | Рацетам | Утилитарное, торчевое | Ноотропное средство. Дает очень слабую стимуляцию. | AMPA модулятор, релизер ацетилхолина | Стимуляция | Тахикардия, головная боль | 2 | 100 | 500 | 3 | 5 | Нет | | Легко |
| Омберacetам | Ноопепт | Стимулятор | Рацетам | Утилитарное, торчевое | Похоже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается. | AMPA модулятор, релизер ацетилхолина | Стимуляция | Тахикардия, головная боль | 2 | 20 | 40 | 3 | 5 | Нет | | Без рецепта |
| Бетагистин | Бетасерк | Стимулятор | | Торчевое | Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос. | Ингибитор диаминооксидазы | Стимуляция | Жжение слизистой при занюхивании | 1 | 50 | 100 | 1 | 2 | Нет | | Без рецепта |
| Дифенгидрамин | Димедрол, Антигриппин, Левросо | Делириант | Этанолламин | Торчевое | Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Как и любое другое холиноготно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева, а при длительном употреблении вызывает деменцию. Не рекомендуется к употреблению. | M-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 | 100 | 700 | 5 | 10 | Слабая | | Легко |
| Гиосцин | Бускопан | Делириант | Тропан | Торчевое | Действующее вещество дурмана. Ходят слухи что его нужно курить как соль. | M-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 ? | ? | | 3 | 4 | Слабая | | Трудно |

| Вещество | Другие названия | Фарм группа | Хим группа | Торч группа | Описание | Фарм действие | Эффекты | Побочки | ☆ | Дозы, мг | | Время действия, ч | | Зависи мость | Отбивка | Достать |
|-----------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---|---|---|--|---|----------|------|-------------------|----|--------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тропикамид | Тропикам | Делириант | | Торчевое | Капли в глаза нос. Прет слабо. | М-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 | ? | ? | ? | ? | Слабая | | Трудно |
| Циклопентолат | Цикломед, Циклоптик | Делириант | | Торчевое | Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо. | М-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 2 | ? | ? | ? | ? | Слабая | | Трудно |
| Дицикловерин | Триган-Д | Делириант | | Торчевое | Тоже классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола. | М-холинолитик | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, тяжесть, амнезия | 2 | ? | ? | ? | ? | Слабая | Холодная вода | Средне |
| Дименгидринат | Авиамарин, Драмина | Делириант | | Торчевое | Тот же димедрол, только еще со стимулирующим эффектом как у кофеина. | М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозина | Галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия | 1 | 250 | 750 | 5 | 10 | Слабая | | Без рецепта |
| Доксиламин | Донормил | Делириант | | Торчевое | В целом похоже на димедрол, но больше хочется спать. Продается как снотворное. | М-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 | 75 | 450 | 8 | 24 | Слабая | | Легко |
| Супрастин | | Делириант | | Торчевое | Еще одно димедролоподобное средство от аллергии. | М-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 | ? | ? | ? | ? | Слабая | | Без рецепта |
| Тавегил | | Делириант | | Торчевое | И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их. | М-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 | ? | ? | ? | ? | Слабая | | Без рецепта |
| Тригексифенидил | Циклодол | Делириант | | Торчевое | Средство для купирования побочек нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что слиздить из ПНД. | М-холинолитик | Эйфория, седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, тяжесть, амнезия | 3 | ? | ? | ? | ? | Сильная | | ПКУ |
| Бипериден | Мендилекс | Делириант | | Торчевое | Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма. | М-холинолитик | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, тяжесть, амнезия | 1 | ? | ? | ? | ? | Слабая | | Трудно |
| Гидроксизин | Атаракс | Делириант | | Торчевое | Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное. | М-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 | ? | ? | ? | ? | Слабая | | Трудно |
| Прометазин | Пипольфен | Делириант | | Торчевое | Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик. | М-холинолитик, антигистамин | Седация, галлюцинации, делирий | Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия | 1 | ? | ? | ? | ? | Слабая | | Трудно |
| Бензидамин | Тантум Роза | Делириант | Индазол | Торчевое | Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз. | Релизер дофамина, М-холинолитик | Стимуляция, галлюцинации, делирий | Бессоница, тахикардия | 3 | 500 | 2500 | 5 | 24 | Нет | Спирт | Легко |

| Вещество | Другие названия | Фарм группа | Хим группа | Торч группа | Описание | Фарм действие | Эффекты | Побочки | ☆ | Дозы, мг | | Время действия, ч | | Зависи мость | Отбивка | Достать |
|-----------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|---|--|--|---|---|----------|------|-------------------|----|--------------|--------------------|-------------|
| Амантадин | Мидантан, ПК-Мерц | Диссоциатив | Адамантан | Торчевое | Слабый диссоциатив. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей. | NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист | Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий | Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота | 3 | 300 | 2000 | 12 | 24 | Слабая | | Средне |
| Римантадин | Ремантадин | Диссоциатив | Адамантан | Торчевое | Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками. | NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист | Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий | Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль | 1 | 250 | 1500 | 12 | 24 | Слабая | | Без рецепта |
| Мемантин | Меманталь | Диссоциатив | Адамантан | Торчевое | Чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортах пишут что упарывались даже до k-hole. В очень больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана. | NMDA антагонист, D2 агонист, сигма агонист | Диссоциация, стимуляция | Задержка мочи, запор | 4 | 30 | 200 | 18 | 36 | Слабая | | Средне |
| Декстрометорфан | Каффетин Колд, Тофф+ | Диссоциатив | Морфинан | Торчевое | Каноничный диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки). | NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист | Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория | Задержка мочи, тахикардия | 5 | 100 | 800 | 8 | 12 | Слабая | КЩЭ, холодная вода | Легко |
| Флупиртин | Катадолон | Диссоциатив | | Торчевое | Когда-то популярный препарат, ныне запрещен и покупается только у барыг. Действие короткое и странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM. Гепатотоксичен. | Активатор калиевых ионных каналов | Диссоциация, седация, эйфория | Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит | 4 | 300 | 600 | 1 | 2 | Слабая | | Нет в РФ |
| Преноксидиазин | Либексин | Диссоциатив | | Торчевое | Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки. | Сигма агонист | Диссоциация, седация, галлюцинации | Сухость во рту, тошнота, боль в желудке | 1 | 500 | 1000 | 4 | 8 | ? | | Трудно |
| Кодеин | Терпинкод, Нурофен+ | Опиоид | Морфинан | Торчевое | Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально. | Мю агонист | Эйфория, седация, дрёмы | Запор, чесотка | 5 | 50 | 300 | 4 | 6 | Сильная | КЩЭ, холодная вода | ПКУ |
| Трамадол | Трамал, Залдиар | Опиоид | | Торчевое | Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома. | Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина | Эйфория, дрёмы | Запор, чесотка | 5 | 100 | 300 | 4 | 8 | Сильная | | ПКУ |
| Тапентадол | Палексия | Опиоид | | Торчевое | Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол. | Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина | Эйфория, дрёмы | Запор, чесотка | 5 | 50 | 200 | 4 | 8 | Сильная | | ПКУ |
| Тримебутин | Тримедат | Опиоид | | Утилитарное, торчевое | Панацея от опиатных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты. | Мю агонист, М-холинолитик | Седация | Тошнота, сонливость | 2 | 1000 | 2000 | 3 | 5 | Сильная | | Трудно |

| Вещество | Другие названия | Фарм группа | Хим группа | Торч группа | Описание | Фарм действие | Эффекты | Побочки | ☆ | Дозы, мг | | Время действия, ч | | Зависи мость | Отбивка | Достать |
|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|---|----------------|--|--|-----|----------|------|-------------------|----|--------------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лоперамид | Имодиум | Опиоид | | Утилитарное, торчевое | Вместе с АПФ-ингибиторами/хинидином и в огромных дозах проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Дает слабы опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных | Мю агонист | Седация | Запор | 1 ? | ? | ? | ? | ? | Сильная | | Без рецепта |
| Прегабалин | Лирика | Депрессант | Габапентиноид | Торчевое | Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально. | Блокатор VDCC | Опьянение, эйфория, седация, стимуляция, эмпатия, гипнагогия | Сонливость, судороги | 5 | 150 | 900 | 9 | 17 | Сильная | | ПКУ |
| Габапентин | Нейронтин, Катэна | Депрессант | Габапентиноид | Торчевое | ГАМК наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса, заедать жирным. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Самая легкая отмена из габапентиноидов. | Блокатор VDCC | Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, гипнагогия | Сонливость, судороги | 4 | 300 | 2400 | 6 | 10 | Сильная | | Средне |
| Баклофен | Баклосан | Депрессант | Габапентиноид | Торчевое | Классика ГАМКов. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догоняться. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны. Кросс-толер с фенибутом. Самая тяжелая отмена из габапентиноидов. | ГАМК-Б агонист | Опьянение, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия | Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках | 4 | 25 | 100 | 8 | 14 | Сильная | | Трудно |
| Фенибут | Анвифен, Ноофен | Депрессант | Габапентиноид | Торчевое | Младший брат баклосана. Более эйфоричен, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Толерантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном. | ГАМК-Б агонист | Опьянение, седация, эйфория, эмпатия | Сонливость, тошнота, боль в желудке | 4 | 500 | 3500 | 6 | 10 | Сильная | | Средне |

| Вещество | Другие названия | Фарм группа | Хим группа | Торч группа | Описание | Фарм действие | Эффекты | Побочки | ☆ | Дозы, мг | | Время действия, ч | | Зависи мость | Отбивка | Достать |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---|----------|-----|-------------------|----|---------------|-------------|-------------|
| Зопиклон | Сомнол, Имован | Депрессант | Z-препарат | Торчевое | Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиногону. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки толочь и нюхать. | селективный ГАМК-А агонист | Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий | Сонливость, амнезия | 3 | 7,5 | 15 | 9 | 24 | Сильная | | ПКУ |
| Залеплон | Соната Адамед | Депрессант | Z-препарат | Торчевое | Как запиклон, только слабее и с коротким действием. | селективный ГАМК-А агонист | Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий | Сонливость, амнезия | 3 | 10 | 60 | 1 | 2 | Сильная | | ПКУ |
| Алпразолам | Ксанакс | Депрессант | Бензодиазепин | Утилитарное | Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Внимание: не нужно пытаться поторчать на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна и снятия тревоги. | ГАМК-А агонист | Седация, уменьшение тревоги | Сонливость | 5 | 0,25 | 1,5 | 5 | 8 | Очень сильная | | ПКУ |
| Диазепам | Реланиум, Валиум | Депрессант | Бензодиазепин | Утилитарное | Типичный бенз, аналогично алпразоламу. | ГАМК-А агонист | Седация, уменьшение тревоги | Сонливость | 5 | 5 | 15 | 4 | 8 | Очень сильная | | ПКУ |
| Феназепам | | Депрессант | Бензодиазепин | Утилитарное | Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь. | ГАМК-А агонист | Седация, уменьшение тревоги | Сонливость | 4 | 0,5 | 4 | 15 | 24 | Очень сильная | | ПКУ |
| Клоназепам | Клонопин | Депрессант | Бензодиазепин | Утилитарное | Типичный бенз, аналогично алпразоламу и диазепаму. | ГАМК-А агонист | Седация, уменьшение тревоги | Сонливость | 5 | 0,5 | 2 | 8 | 12 | Очень сильная | | ПКУ |
| Грандаксин | | Депрессант | Бензодиазепин | Утилитарное | Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Зато можно достать. | ГАМК-А агонист | Седация, уменьшение тревоги | Сонливость | 2 | 50 | 250 | 6 | 8 | Очень сильная | | Трудно |
| Фенобарбитал | Валокордин, Корвалол | Депрессант | Барбитурат | Утилитарное | Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензы. Зато по доступной цене и отпускают без проблем. | ГАМК-А агонист | Седация, уменьшение тревоги | Сонливость | 2 | 50 | 300 | 12 | 48 | Очень сильная | Выпаривание | Без рецепта |
| Этифоксин | Стрезам | Депрессант | | Утилитарное | Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов. | ГАМК-А модулятор | Седация, уменьшение тревоги | Сонливость | 1 | 50 | 200 | 6 | 8 | Нет | | Средне |
| Карисопродол | Каризопродол, Сома | Депрессант | | Утилитарное, торчевое | Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от бензов им хоть как-то можно упороться. | ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина | Седация, уменьшение тревоги, опьянение | Сонливость | 2 | 350 | 700 | 3 | 6 | Очень сильная | | Нет в РФ |
| Карбамазепин | Финлепсин | Депрессант | | Утилитарное | Нормотимик. Дает неприятное овощное расслабленное состояние. Токсичен, большие дозы могут быть опасны. | Блокатор натриевых каналов | Седация, овощное состояние | Сонливость, тошнота | 1 | 200 | 400 | 12 | 24 | Нет | | Средне |

| Вещество | Другие названия | Фарм группа | Хим группа | Торч группа | Описание | Фарм действие | Эффекты | Побочки | ☆ | Дозы, мг | | Время действия, ч | | Зависи мость | Отбивка | Достать |
|-------------|-----------------|----------------|------------|-------------|--|---|--|--|---|----------|-----|-------------------|----|--------------|---------|---------|
| Тизанидин | Сирдалуд | Депрессант | | Утилитарное | Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает овощную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации. Гепатотоксичен. | Агонист альфа-2 адренорецепторов | Седация, овощное состояние | Сонливость, низкое давление | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | Слабая | | Легко |
| Арипипразол | Арипразол | Нейролептик | | Утилитарное | Дорогой атипичный нейролептик. Снимается с психозов. | Антагонист D2, 5HT-2 | Седация, овощное состояние | Сонливость, головная боль, расстройство пищеварения, нарушения метаболизма | 2 | 10 | 30 | ? | ? | Слабая | | Трудно |
| Алимемазин | Тералиджен | Нейролептик | | Утилитарное | Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное. | Антигистамин, антагонист D2 | Седация, уменьшение тревоги, овощное состояние | Сонливость, головокружение, сухость во рту | 2 | 20 | 80 | 6 | 12 | Слабая | | Трудно |
| Кветиапин | Сероквель | Нейролептик | | Утилитарное | Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овощащее успокоительное. | Антигистамин, антагонист D1, D2, 5HT-1, 5HT-2 | Седация, овощное состояние | Сонливость, головная боль, расстройство пищеварения | 2 | 100 | 300 | 4 | 8 | Слабая | | Трудно |
| Сультпирид | | Нейролептик | | Утилитарное | Атипичный нейролептик с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. | Антагонист D2, D3, 5HT-2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | | Трудно |
| Флуоксетин | Прозак | Антидепрессант | | Утилитарное | Самый доступный из антидепрессантов. Принимать курсом, как и все СИОЗС. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и агитацию. Осторожно: сочетание антидепрессантов и релизоров серотонина приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход. | СИОЗС | Стимуляция, мания | Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота | 2 | 20 | 60 | | | Слабая | | Средне |
| Пароксетин | Паксил | Антидепрессант | | Утилитарное | Примерно то же что и флуоксетин, но еще и со слабыми антигистаминными эффектами. | СИОЗС, М-холинолитик, антигистамин | Стимуляция, мания | Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота | 2 | 20 | 60 | | | Слабая | | Трудно |
| Сертралин | Золофт | Антидепрессант | | Утилитарное | Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с параксетином, но немного поприятнее и с менее жесткой отменой. | СИОЗС | Стимуляция, мания | Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота | 2 | 50 | 200 | | | Слабая | | Трудно |

| Вещество | Другие названия | Фарм группа | Хим группа | Торч группа | Описание | Фарм действие | Эффекты | Побочки | ☆ | Дозы, мг | | Время действия, ч | | Зависи мость | Отбивка | Достать |
|--------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|--|---|--|--|---|----------|-----|-------------------|----|--------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Флувоксамин | Феварин | Антидепрессант | | Утилитарное | И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком. | СИОЗС | Стимуляция, мания | Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота | 2 | 50 | 300 | | | Слабая | | Трудно |
| Венлафаксин | | Антидепрессант | | Утилитарное | Вроде как один из лучших имеющихся антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упарывать в больших дозах. | СИОЗСН | Стимуляция, мания | Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота | 3 | 75 | 225 | | | Сильная | | Трудно |
| Дулоксетин | | Антидепрессант | | Утилитарное | Что-то наподобие венлафаксина. | СИОЗСН | Стимуляция, мания | Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота | 3 | 60 | 120 | | | Сильная | | Трудно |
| Амитриптилин | | Антидепрессант | | Утилитарное, торчевое | Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овощит. Можно упарывать как холинолитик. | ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин | Седация, овощное состояние, галлюцинации | Сонливость, сухость во рту, низкое давление | 1 | 50 | 300 | ? | ? | Слабая | | Трудно |
| Миртазапин | Каликта | Антидепрессант | | Утилитарное, торчевое | Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овощащий. От долго применения жиреют из-за повышенного аппетита. Мощное снотворное. В больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие. | Антагонист 5HT-2, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинолитик, антигистамин, каппа агонист | Седация, гипнагогия, галлюцинации | Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение | 3 | 45 | 270 | 14 | 24 | Слабая | | Трудно |
| Тразодон | Триттико | Антидепрессант | | Утилитарное | Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Можно использовать как снотворное. | Антагонист 5HT-2, ИОЗ серотонина | Седация, повышение либидо | Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота | 3 | 75 | 300 | | | Нет | | Трудно |